

في حالات الطوارئ، أو إذا وجدت هذه البطاقة،  
يرجى الاتصال بالطبيب المذكور أدناه:

اسم/عيادة الطبيب، اسم المركز/المستشفى:

---

رقم الهاتف:

---



---

توجد

معلومات طبية هامة

ضمنه

للمرضى اللذين يعالجون باستخدام دواء داراتوموماب:

يرجى إبراز هذه البطاقة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية قبل أي عملية نقل دم وحملها لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية العلاج لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع لنشرة بيانات المريض

بطاقة تعريفية للمرضى اللذين يعالجون باستخدام داراتوموماب

الاسم: -----

أنا أعالج باستخدام الأدوية الآتية:

دواء داراتوموماب (أجسام مضادة)

لعلاج

السرطان النقوي (خلايا البلازما) المتعدد

وقد توقفت عن تناول هذا الدواء في يوم ----- /شهر----- / سنة -----

السادة مقدمي خدمات الرعاية الطبية،

Daratumumab is associated with the risk of interference with blood typing. The Indirect Coombs test (Indirect antiglobulin test [IAT]) may show positive results in patients taking daratumumab, even in the absence of antibodies to minor blood antigens in the patient's serum which may persist for up to 6 months after the last dose. The determination of a patient's ABO and Rh blood type are not impacted. If an emergency transfusion is required, non-cross-matched, ABO/RHD compatible RBCs can be given per local blood bank practices.

For more information, please use this reference as a source of additional information:

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf>

Or contact local medical information service at Janssen Egypt Scientific Office

**Address :** Building 44, North Teseen street, 5th settlement, New Cairo, P.O  
Box 11835, Cairo, Egypt

**Telephone:** +2 21291100 /+221291199

**Email:** JACEG-PV@its.jnj.com

قبل بدء العلاج باستخدام داراتوموماب، كانت نتائج تحليل الدم خاصتي،

التي أجريتها بتاريخ: يوم-----/شهر-----/سنة----- كالآتي:

Rh-  Rh+  O  AB  B  A فصيلة الدم:

Indirect Coombs test (antibody screen) was:

نتيجة تحليل كومبس غير المباشر (للأجسام المضادة) كانت:

Positive إيجابية (للأجسام المضادة التالية)  Negative سلبية

أخرى: -----

بيانات الاتصال للمركز الذي أجريت فيه تحاليل الدم: -----